

N^o 116. observations Sur l'avantage De la
position, Dans Les dépôts à La Suite
Des plaies De la partie antérieure &
inférieure De la Cuisse, par M^r.
Enjoubault De Verval Chirurgien
à avanches le 1^{er} 86u 1783

De tous les moyens Curatifs employés par la
Chirurgie, La position Étant Sans Contredit un des
premiers moyens.
En présentant mes observations j'en pretens peu
au mérite De la nouveauté, Car Dans tous les temps
La Chirurgie a prescrit ce moyen, mais les auteurs
dogmatiques ne l'ont point encore prescrite d'une
manière assez déterminante, soit une pareille
plusieurs observations réunies sous un même
point de vue, pourrout déterminer à y recourir
toutes les fois qu'il sera possible.

ambroise paré a fait un chapitre De la
situation Des parties blessées, mais son objet n'a
été que de donner une conformation moins
difforme, & moins onéreuse à la suite d'un

G




ARCH 2

N^o 141

plais des jointures;

Ce que je me propose, est de faire voir qu'en y enant plus promptement que par tout par la position que par tout autre moyen; pour se convaincre de ma proposition, il ne s'agit que de Consulter la Nature. Dans les apostumes en suppuration, c'est presque toujours dans la partie la plus declive ou l'ouverture se fait spontanément, le pus s'évacuant par son propre poids permet aux parties dissequées par la suppuration, de se rapprocher, & la Cure est prompte; Si une main mal dirigée applique une emplâtre sur l'ouverture, l'emplâtre en se collant fait l'office de la peau, & la Cure est retardée.

Monsieur qu'on a si bien connu les avantages du moyen que j'expose, que dans le précis de ses observations sur la multiplicité des troyens, il dit qu'il est bonnant que nous ayons si peu d'exemples de Contre ouvertures pratiquées au Crâne, &c. En effet, si on ne peut mettre le Malade dans une position où les matieres puissent s'évacuer après l'application du troyen, n'est il pas plus prudent d'appliquer une seconde Couronne dans une partie plus declive que d'attendre



que les matieres reduites en saie percent a travers
los, Comme il arriva a la femme que Mr. Javiard
trepana à l'Hotel Dieu de Paris.

Encouragé d'un précepte de Mr. qui n'ai, j'ai appliqué
le trepan en contre ouverture, à une fracture qui
s'étendait depuis la partie moyenne du coronal
jusqu'à la partie postérieure du parietal droit,
deux couronnes furent appliquées, l'une à la partie
antérieure, l'autre à la postérieure de la fracture,
de manière que dans quelque position on fut
le Malade, les matieres épanchées avoient toujours
leur issue & le blessé guérit parfaitement.

quoique cette observation ne fasse pas partie de
celles que je me propose de détailler, je ne la
craie pas néanmoins hors de propos, car j'en vois
en vûe dans la contre ouverture, que de trouver
une position pour le placement des matieres.

L'objet de mes observations roule particulièrement
sur les dépôts qui arrivent ordinairement, à
la suite des plaies de la partie antérieure
et inférieure de la cuisse;

Comme j'ai eu occasion d'en voir plusieurs dans
cette partie, j'ai eu aussi celle d'en observer



Les accidents, qui pres que toujours ont été
uniformes.

Les plaies de la partie antérieure & inférieure de
la Cuisse, peuvent être en travers, en long, ou
obliquement, elles penetrent plus ou moins
avant, & peuvent être occasionnées par des
causes différentes; lors qu'elles sont faites
par des instruments tranchants, elles ne sont
pres que pas sensibles, quelque profondes qu'elles
soient, & la Cicatrice s'en fait pour l'ordinaire
promptement, mais Les accidents n'en sont pas
moins à redouter pour cela, Car pour l'ordinaire
huit ou dix jours après, la partie enflée, devient
douloureuse, la Cicatrice se rouvre d'elle même,
& il sort une matière terreuse & sanguinolente;
mais avant la rupture de la Cicatrice, il s'est fait
une fonte de suppuration dans le tissu Cellulaire
à trois ou quatre poudes dans la circonférence
de l'ouverture, le pus s'amasse dans des sacs
différents. Suivant Les attitudes ou le malade
se couche, & pour Les vuider il paroitroit
urgent d'avoir recours aux Contes ouvertes.

C'est pour y opposer que je propose la
position, les succès dont elle a été suivie, sont
des preuves incontestables de ses avantages...

observation d'un jeune homme de quinze ans, se blessa avec
une hache à pied, dont les chirurgiens se
servent, cet outil étant tenu de la main gauche,
coupant transversalement le muscle droit antérieur
à une ponce au dessus de la rotule, le blessé
ne ressentit presque pas de douleur, mais il ne
put marcher; mon premier soin fut de rapprocher
les lèvres de la plaie qui étoient écartées, je les
maintins rapprochées par un bandage unissant
tenant toujours les ténus dans l'étension, la
plaie se cicatrissa dans huit jours, le malade
impatience de garder si long temps la même position,
se leva, marcha assez facilement à la faveur
d'un bâton, mais au bout de huit jours la
cuisse se tuméfia, devint faible, le malade
fit un faux pas, la cicatrice se rouvrit, et il
écoula environ un gobelet de matière brune
et sanguinolente; En pressant la Cuisse sur



B

Les parties latérales, le pus montoit contre son
propre poids, & sortoit par l'ouverture; on ne
pouvoit pas facilement l'absorber de la profondeur
des clapiers, ala faveur de la sonde, attendu que
la forme cylindrique de la partie s'opposoit à
l'introduction.

Les Contres ouvertures paroissent indiquées, mais
comme les moyens ne sont employés que pour
donner issue au pus, j'ai trouvé plus expédient
de faire coucher le malade sur le ventre, afin
que les matieres se précipitassent par leur propre
poids vers l'ouverture d'ici je pratiquai, qui
se trouvoit par cette position dans la partie
la plus declive. Et avertis que les matieres se
formoient, elles s'évacuoient; En peu de jours les
parties écartées par la présence du fluide & sang
se rapprochèrent, s'agglutinaient, & le malade
fut guéri; mais il boita pendant plus de deux
ans, au bout duquel temps les parties se sont
fortifiées au point qu'il marche assez librement.

observation 2^e.

un bucheron se donna un coup de hache

B

sur la partie antérieure & inférieure. D'une de
les Cuidres, le talon de la hache pénétra jusqu'au
la plaie étoit petite & oblique, le malade n'en
marcha pas moins, & la plaie fut guérie en deux
jours, mais huit jours après il survint gonflement
douleur, fièvre, & il se forma un ample dépôt,
qui s'ouvrit spontanément par la Cicatrice, il
s'évacua plus de deux gobelets d'une matière
lécueuse, & chaque jour il s'en évacua bien la
valeur d'une chopine, avec des flocons de
matière y raidie; au bout de six jours le
malade étoit guéri, tant par la douleur, la
fièvre, l'insomnie, que par l'abondance des
évacuations, m'en voya chercher, En appuyant
les mains sur les parties latérales de la Cui-
dre qui étoit fort tuméfiée, la matière jaillit
& son abondance me fit juger de l'étendue des
clapiers; pour éviter les Contus ouvertes je
fis placer le malade dans la position qui
avoit si bien réussi dans mon observation précédente,
& il est difficile d'exprimer le succès qui en
résulta, tous les accidents cessèrent, & au bout



B

De douze jours le blessé fut guéri sans
claudication.

observation 3^{me}

un charon se donna un coup de baïonnette à
un pouce au dessus de la rotule, la plaie étoit
transversale et ne pénétrait que dans le tissu
cellulaire, elle se cicatrisa deux jours après,
mais au bout de huit jours il se forma un
dépôt, qui s'ouvrit spontanément par la
cicatrice, le malade étant couché sur le côté
de la cuisse blessée, il se fit une fureur à la
partie latérale externe, et le pus ne pouvoit
sortir qu'en appuyant fortement sur le côté;
Les douleurs qui étoient la suite de ce dépôt
determinaient à m'envoyer chercher, j'employé
le même moyen qu'en mes précédentes observations
et le succès répondit dans deux jours à mes
espérances.

Je ne crois pas devoir rapporter d'autres faits
à l'occasion des plaies faites par instruments
tranchants, pour démontrer les avantages de la
position, si j'en avais eu nécessaire, j'en aurois pu

B

En cites encore trois autres dont les circonstances
sont presque égales; mais l'observation suivante
est plus que démonstrative pour prouver
victorieusement les avantages de la position.

Observation I^{me} un avocat étant à la Madra receut un Coup
de fusil chargé à plomb; le blessé étant sur
un terrain plus élevé que celui qui tiroit, un
plomb entra dans la cuisse en faisant la partie
supérieure de la rotule en se prolongeant de bas
en haut; Le malade n'en continua pas moins
son service, et la petite plaie par où le plomb
était introduit se guérit facilement. mais
au bout de ^{deux} jours, la cuisse se tuméfia, la
fièvre & l'inflammation furent de la partie,
Le chirurgien CONSULTÉ employa des saignées,
Ladette, & des Cataplasmes Émolliants...
la petite plaie se rouvrit & procura l'issue
d'une abondante matière serreuse & sanguinolente,
Le gonflement ayant été Considérable, la fonte
du tissu Cellulaire le fut aussi, & la matière
s'échappa dans des sacs dont elle ne pouvoit
sortir que par Compression... Rien n'indiquoit



mieux les Contre ouvertures, aussi feroit-elle
proposées; mais le malade ne vouloit y consentir
qu'après avoir eu mon avis; Important la Sonde
pour reconnaître l'étendue des clapiers, elle s'insinua
dans une incision pratiquée par le trajet du plomb.
dont la direction étoit de bas en haut en plongeant
le long du muscle droit, jusque vers le fœtus.
On ne put reconnaître la profondeur de ce sac
ou quelle sonde ne pouvoit atteindre; Effrayé
de cette découverte le malade craignoit les
grandes ouvertures, tant sur les parties latérales,
de la Cuisse, que sur l'antérieure; En l'état
plusieurs incisions étoient indiquées, car si
on lui fait une Contre ouverture adroit, le puer
du Côté gauche n'auroit pas eu d'issue, & vice versa,
Et encore ces deux ouvertures n'auroient point
été suffisantes pour évacuer la matière contenue
dans le trajet du plomb.
pour opposer à tant d'ouvertures je proposai la
position que le malade accueillit avec ardeur,
Et observa avec exactitude; Deux jours après

G

La Suppuration Cessa Entièrement, tous les vides
s'effacèrent, Et au bout de quinze jours le malade
reprit ses Exercices, d'abord faiblement, mais
il ne tarda pas à être aussi fort qu'auparavant.
Des Succès aussi heureux, Et aussi multipliés
ne laissent aucun doute sur la préférence de la
position, à la Couture ouverte, toutes les fois
qu'elle pourra être employée.
il faut observer que je ne mets aucun
appareil sur



11

...the ...
...the ...
...the ...
...the ...

...the ...
...the ...
...the ...

...the ...
...the ...
...the ...

A